



für die Mitglieder des Versuchsrings Ostholstein

## Herbizide für den Nachauflauf RAPS

N.U. Agrar GmbH  
Schackenthal, 04.09.2013  
[nu-agrar@nu-agrar.de](mailto:nu-agrar@nu-agrar.de)



# Rapsherbizide für den (späten) Nachauflauf

2-Laubblatt	NA (Herbst)	NA Herbst und Frühjahr	NA (Herbst)	4- bis 6-Blattstadium	6-Blattstadium	ab 6-Blattstadium
<b>Metazachlor + Quinmerac</b> (Butisan Top)	<b>Clopyralid</b> (Lontrel)	<b>Chlopyralid + Picloram</b> (Effigo)	<b>Chlopyralid + Picloram + Aminopyralid</b> (Runway)	<b>40 % Bifenox</b> (Fox) eventuell Splitting [+ 60% Bifenox]	<b>Pendimethalin</b> (Stomp Aqua)	<b>Propyzamid 1)</b> (Kerb Flo)
Ehrenpreis Vogelmiere Kamille Distel Hundspeters. Schierling Klettenlabkr.	Kamille Distel Hundspetersilie Kornblume Schierling Leguminosen	Kamille Distel Hundspetersilie Kornblume Schierling Leguminosen Klettenlabkraut Latticharten	Kamille Distel Hundspetersilie Kornblume Schierling Leguminosen Klettenlabkraut Latticharten Klatschmohn TW Viola	Stiefmütterchen Ackerkrummhals Ochsenszunge  (Weg-) Rauken (Teilwirkung) Storchschnabel	Vogelmiere Stiefmütterchen Ackerkrummh. Ochsenszunge Klatschmohn	Ehrenpreis Vogelmiere     Ausfallgetreide Trespen A.Fuchsschwanz Windhalm

1) Bodentemperatur unter 7 °C, Kerb nicht mit Tebuconazol mischen



# Raps-Herbizide

## Nachbehandlung im Nachauflauf

Herbizid	Aufwandmengen	Zielrichtung
Raps ab 2-Blattstadium, gegen aufgelaufene Unkräuter (Blattwirkung)		
Effigo	0,15 0,25 0,35	Kamille nach Vorlage von Butisan/Clomazone Kamille, Kornblumen, Kletten nach Vorlage große Kletten, größere Disteln
Butisan Top + Effigo/Runway	0,4 bis 0,6 + 0,2	Kamille, Kletten, Schierling (Kerbel) Disteln, Kornblumen, Windenknöterich
Raps ab 4-Blattstadium (0,3 Fox) bzw. 6-Blatt (0,7 Fox), Stomp Aqua		
Fox Splitting	0,3 + 0,7	Stiefmütterchen, Storchschnabel, Ackerkrummhals, TW Wegrauke <i>Fox benötigt Licht zur Wirkung</i>
Effigo/Runway + Fox	0,25 + 0,3 bis 0,5	Kletten, Kamille, Schierling, Kornblumen, Distel Stiefmütterchen, Storchschnabel, Wegrauke
Stomp Aqua	2,0	Ackerkrummhals, Klatschmohn, Stiefmütterchen, TW Hirtentäschel, Hellerkraut
Bodentemperatur unter 7 °C, nicht mit Folicur mischen, wenn Dauerfrost bevorsteht		
Kerb flo	1,25 bis 1,75	Ehrenpreis, Vogelmiere Ausfallgetreide, AFU + Gräser (außer Quecken)



# Copyright N.U. Agrar GmbH

Eine Weitergabe in digitaler Form auch auszugsweise ist **nicht** gestattet.

Die Unterlagen/Handouts dürfen in Ihrem Layout und Inhalt nicht verändert werden.

Im Besonderen ist eine Entfernung der Copyright Hinweise verboten.

Es ist nur ein Ausdruck für die Mitglieder der Versuchsringses gestattet.

Jede weitere Nutzung ist untersagt, oder Bedarf meiner Zustimmung im Einzelfall.